

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**KAIGEN**

止めたいせきに

# カイゲン咳止錠

バクモンドウ乾燥エキス配合

第②類医薬品

せきは、のどや気管支の病気に伴って起こる症状で、せきが長く続くと、のどを痛めたり、声がかすれるだけでなく体力が著しく消耗し、病気に対する抵抗力も弱ります。カイゲン咳止錠に配合されているバクモンドウは古くから、炎症性のせきを少しずつめる効果の高い生薬として漢方薬で使用されています。カイゲン咳止錠はせきをしずめ、たんどの切れをよくするお薬です。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. **次の人は服用しないでください**  
12才未満の小児。
2. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**  
（眠気等があらわれることがあります。）
4. **授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**
5. **過量服用・長期連用しないでください**



### 相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

3. **服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**  
便秘、口のかわき、眠気
4. **5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

## 〈効能・効果〉

せき、たん

## 〈用法・用量〉

次の1回量を1日4回食後及び就寝前に服用してください。

年齢	15才以上	12才以上15才未満	12才未満
1回量	3錠 ○○○	2錠 ○○	服用しないこと

## 用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) 錠剤の取り出し方は右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してから服用してください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突きささる等思わぬ事故につながります。)



## 〈成分・分量〉

12錠(1日量)中

成分	分量	はたらき
ジヒドロコデインリン酸塩	30 mg	せきの中枢に作用して、せきをしずめます。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	75 mg	気管支を広げ、せきをしずめます。
ノスカピン	45 mg	せきの中枢に作用して、せきをしずめます。
グアイフェネシン	300 mg	たんの切れをよくし、せきを軽くします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12 mg	せきやたんの原因となるアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	150 mg	各成分の働きをたすけ、ねむけを除きます。
バクモンドウ乾燥エキス (バクモンドウとして1.5g)	300 mg	炎症性のせきをしずめます。

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有します。

## 〈保管及び取扱い上の注意〉

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。  
カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911  
受付時間：9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)

発売元 **カイゲンファーマ株式会社**  
大阪府中央区道修町二丁目5番14号

製造販売元 **大昭製薬株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168