

Z2290-3989T
1
00604557

アズクールのどスプレー

第3類医薬品 30mL

口腔咽喉薬

この箱はお薬とともに保管し、
使用の際にはよくお読みください。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3) 口内にひどいだれのある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤・かゆみ |
| □ | 刺激感 |

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ、のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

用法・用量に関する注意

●定められた用法・用量を厳守してください。●小児に使用される場合には保護者の指導監督のもとに使用させてください。●のどや口内への塗布用にのみ使用し、内服しないでください。●ノズルを患部に向けて、アーッと声を出しながら噴射してください(息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがあります)。●目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

成分・分量

アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物 0.02g
添加物:グリセリン、イメントール、クエン酸ナトリウム水和物、プロピレングリコール、香料

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



製造
番号
使用
期限



箱



保管及び取扱い上の注意

●直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。●他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります)。●薬液が衣類などに付着した場合には、すぐに水又は洗剤で洗ってください。●使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。●火気に近づけないでください。

ご使用方法

●初めてお使いになるときは、液が出るまで数回空押してください。●低温では液が出にくくなることがあります。常温でご使用ください。●ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。●使用後、ノズルの部分に液が付着したときは、清潔なティッシュペーパー等で拭いてからオーバーキャップをかぶせてください。

【販売元】
カイゲンファーマ株式会社
大阪市中央区道修町二丁目5番14号

お客様相談室
☎ 06-6202-8911
受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

【製造販売元】
昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

Sug2202